

Captura de un Martinete en plena calle de Tolosa

Un Martinete joven apareció volando bajo, junto al Puente Nuevo y chocó contra un camión aparcado en la calle de Santa Clara. Una vez en el suelo se le pudo capturar con vida. Esto ocurrió el 13 de julio de 1966, hacia las 12,30 horas, y a la vista de muchas personas que circulaban en aquel momento por el lugar.

El ejemplar fue examinado posteriormente, comprobándose que se trataba de un joven con plumaje oscuro, con algunos plumones todavía en los extremos de las plumas de la cabeza, estimándose su edad en menos de 3 meses. No presentaba ninguna herida aunque estaba algo delgado y debilitado.

Fue soltado el día 14, a las 22 horas, junto al aeropuerto de Fuenterrabía, en unos carrizales.

Juan Marquet Aldasoro.

Nota de la Redacción. — Es muy posible que las capturas y observaciones de Martinetes en Guipúzcoa están en íntima relación con la colonia de cría localizada en las márgenes del Adour (B. P.) Francia, descubierta en 1963 por los señores Lacoste y D'Elbée, este último socio de Aranzadi, y miembros ambos del C.R.M.M.O.

Esta colonia del Adour está muy cercana a nuestra provincia, a menos de 50 km. de la frontera.

J. E.

Observación de Cigüeña común (Ciconia, ciconia)

El día 31 de enero de 1965, con un tiempo espléndido observé una Cigüeña común que planeaba sobre el Pantano de Albina, situado en el término de Villarreal de Alava, a unos 600 metros sobre el nivel del mar en zona de mucho arbolado. Esta localidad está fuera y al norte de la zona de nidificación de Cigüeñas en Iberia, y extraña lo temprano de la fecha.

Jesús Elósegui Aldasoro.

Cisne cantor (Cygnus cygnus), en Guipúzcoa

El 15 de noviembre de 1959 fueron cazados dos Cisnes junto a la presa del río Oria, de «La Salvadora», de Villabona. Examiné las pieles, siendo identificadas sin lugar a dudas.

Ignacio Ameztoy.

Porriones moñudos (Nyroca fuligula), en Guipúzcoa

En el mes de febrero de 1955 fue muerto y cobrado un ejemplar macho de esta especie en la ría de Orío (43,16 N; 2,08 W).

En el mismo año y mes, cuatro Porriones moñudos (3 machos y 1 hembra) permanecieron en el río Urumea, dentro de la ciudad de San Sebastián y precisamente entre los puentes de María Cristina y Santa Catalina, durante tres días. Pudieron ser observados a placer, con prismáticos.

Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy)

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), capturado en Isaba (Navarra)

En el mes de septiembre de 1966 he contemplado detenidamente un Quebrantahuesos joven (con plumaje oscuro), naturalizado, en casa de nuestro consocio don Tomás López Selles, de Pamplona. Me informa el Sr. López Selles que lo compró en el año 1952 a un cazador que lo había abatido de un tiro en los montes de Isaba, Valle de Roncal (Navarra).

Jesús Elósegui Irazusta.

Captura de Aguila pescadora (Pandion haliaëtus)

Se encuentra naturalizado en el taller de taxidermia de José Miguel Elósegui, un Aguila pescadora que ha sido cazada el 20 de septiembre de 1966, en los alrededores de Tolosa. Las medidas del ejemplar son las siguientes: Ala plegada, 465 mm.; Cola, 190 mm.; Pico, 32 mm.; Uña trasera, 29 mm.; Envergadura, 1,530 mm.; Longitud total, 535 mm.

Tiene banda pectoral muy poco marcada y la parte del pecho y flancos de un blanco casi puro. Posiblemente se trata de un individuo macho y adulto.

Jesús Elósegui Aldasoro.

Halcón de Eleonor (Falco eleonorae), en las costas de Guipúzcoa

El 8 de agosto de 1958, observo un Halcón de Eleonor en los acantilados sobre el mar entre Orío y San Sebastián.

Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy).

Durante unos cinco minutos he contemplado

un halcón que creo se trata de esta especie. Comienza a volar bastante bajo, y va elevándose, planeando, sin mover las alas hasta gran altura. Tamaño apreciado como un Halcón común, la forma de las alas parecida a éste, cola más larga: color muy oscuro, aunque por la parte de abajo, al reflejar la luz del sol parece claro; la cabeza por el reflejo del sol a ratos parece plateada.

Claramente diferenciado del Cernícalo y Alcotán, podría haber una remota confusión con *Falco peregrinus*.

Observado en Igueldo (San Sebastián), junta al Observatorio Meteorológico, a las 15,45 horas del 7 de septiembre de 1966, con tiempo despejado y caluroso, con ayuda de prismáticos.

Jesús Elósegui Aldasoro.

Nota de la Redacción.— Publicamos estas observaciones, con toda clase de reservas, por la dificultad de diferenciación del Halcón de Eleonor de otros halcones: hasta el presente se ha considerado a Eleonor como netamente mediterránea, no existiendo citas en el Cantábrico. Pero ya que las dos observaciones han sido efectuadas en la misma zona, esperamos que en la próxima temporada, puedan desplazarse allí, algunos observadores para comprobar sin lugar a dudas, la presencia o ausencia de esta ave en nuestras costas.

J. E.

Presencia de Codorniz (*Coturnix coturnix*), en Guipúzcoa, en fechas tempranas

Oigo el canto de un macho de Codorniz, en la ribera de Astigarraga (San Sebastián), el 28 de marzo de 1959.

Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy).

San Sebastián, 17 de marzo de 1966.— A las 5 de la tarde, con tiempo despejado, en un antiguo campo de maíz, cubierto de hierba oigo cantar a la primera Codorniz observada este año personalmente. Tengo referencias de varias codornices levantadas el día 11 del corriente, en Añorga (San Sebastián).

Agustín Peraita.

Captura de Gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Una Gaviota cabecinegra adulta fue cobrada el 29 de diciembre de 1963 en el Cantábrico, a unas 4 millas NNE de San Sebastián.

Ignacio. Ameztoy.

Capturas de Mérgulos marinos (*Plautus alle*)

El 6 de enero de 1951 fueron recogidos en la playa de San Sebastián un Mérgulo marino, junto con cuatro Frailecillos (*Frailecula arctica*) —dos de éstos vivos—, por don A. Urbina.

(Del fichero de I. Ameztoy).

A mediados de noviembre de 1957, fue capturado de un tiro por Ascensión Astondo, de Vera, en Palomeras de Echalar (Navarra), en el lugar llamado Chorilepo (43° 14' N.; 1° 22' W.) un ave desconocida por los naturales hasta la fecha.

Al enterarnos que iba a ser naturalizada en San Sebastián, nos presentamos en el taller de taxidermia de los señores Guardamino y Urbina, y con gran sorpresa por nuestra parte comprobamos que se trataba de un Mérgulo marino, en plumaje de transición.

Palomeras de Echalar está a 509 metros s.n.m. y a unos 20 kms. de la costa.

Parece ser ésta una de las primeras citas seguras de captura de esta ave en España, pero además creemos tiene mayor interés dadas las extrañas circunstancias locales de su captura.

Preguntados pescadores y aficionados sobre el particular, aseguran que, si no tan abundante como el Alca (*Alca torda*), tampoco es raro encontrarlo mar adentro, aunque generalmente más alejado de la costa que el Alca.

Ignacio Ameztoy.

Algunos datos sobre llegadas de Cuco (*Cuculus canorus*)

N. de R.—El Cuco, con su monótono pero alegre canto, ha sido siempre en nuestro país un símbolo de anuncio de la primavera, y base de numerosas y simpáticas leyendas. Tenemos varios datos de primeras fechas en que ha sido oído su canto, entre las que destaca, por su antigüedad la primera de ellas, debida a don Ramón María de Lili.

Don Manuel Laborde ha tenido la amabilidad de proporcionarnos todos los datos referentes a Aves, copiados pacientemente del diario de don Ramón María de Lili, Conde de Alacha: estos datos, aunque no los podemos calificar de excepcionales, ya que se refieren a las aves más comunes (Cuco, Vencejo, Golondrina, etc.), sin embargo tienen gran interés por su antigüedad. Vienen a demostrarnos que estas Aves no han cambiado sustancialmente sus costumbres desde hace un siglo; también comprobamos que los fundados motivos que tenemos actualmente sobre la disminución de numerosas especies de Aves, eran compartidos ya entonces por personas observadoras, como lo era el señor Lili.

1877.—29 de abril por la tarde, primer canto del Cuco, oído en el valle de Loyola. Don Ra-