

Estado de conservación de las poblaciones de sapo corredor en la costa vasca

Ion Garín Barrio, Olatz San Sebastián, Xabier Rubio Pilarte

Departamento de Vertebrados, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagaina 11, 20014 Donostia-San Sebastián

igarin@aranzadi-zientziak.org

RESUMEN

El sapo corredor (*Bufo calamita*) se distribuye de manera continua en la mitad meridional de la Comunidad Autónoma Vasca. Sin embargo, las poblaciones costeras son muy escasas y presentan graves problemas de supervivencia. Sólo la de Txingudi está recogida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, como "Vulnerable". En 2004 se ha iniciado el seguimiento de las poblaciones cantábricas con el propósito de determinar su distribución, realizar un primer análisis de la situación, identificar los factores de amenaza y proponer una serie de medidas de conservación. Se ha constatado la existencia de 2 únicas poblaciones costeras, en Irún y Hondarribia (Txingudi, Guipúzcoa) y la playa de Gorrondatxe (Getxo, Vizcaya). La primera posee un elevado grado de fragmentación, provocado por el desarrollo urbanístico y un alto porcentaje de mortalidad por desecación de puestas. Se ha calculado índices relativos de abundancia y establecido algunos parámetros reproductores, tales como el número y viabilidad de las puestas o el sex-ratio. La población de Getxo se encuentra en una situación crítica, dada la falta de humedales de reproducción y el fuerte proceso de aislamiento al que está sometida. Es una población envejecida, con escasos efectivos. En 2006 sólo se han encontrado 6 ejemplares adultos. En la presente campaña se han creado 9 humedales, 7 en Txingudi y 2 en Getxo, como medida de urgencia.